



Rua São Pedro, 1970 – Centro
Teresina – PI • CEP: 64.001-260
(86) 3131.7800 • (86) 99978.0559

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE PARA O EXAME DE ECOENDOSCOPIA ALTA COM PAAF

ECOENDOSCOPIA ALTA

A Ecoendoscopia Digestiva ou ultrassonografia endoscópica é um exame que combina endoscopia e ultrassom de alta resolução. Trata-se de um endoscópio fino e flexível que permite a realização de imagens no interior do tubo digestivo. O transdutor de ultrassom do aparelho permite obter imagens detalhadas das diversas camadas da parede do tubo digestivo em toda a sua espessura, bem como avaliar em profundidade outras estruturas vizinhas do aparelho digestivo, incluindo gânglios linfáticos, vasos sanguíneos, o mediastino, pulmões, fígado, vesícula biliar, vias biliares e pâncreas.

COMO É REALIZADO

Você deitará sobre o lado esquerdo. Um protetor plástico será colocado entre seus dentes para manter sua boca aberta durante o exame. Após a sedação inicial, o médico irá fazer passar o aparelho pela boca, esôfago e estômago, progredindo até ao duodeno. Se houver necessidade, podem ser coletadas biópsias durante a Ecoendoscopia através de uma agulha fina que é passada através do aparelho e introduzida na área de interesse.

PREPARO PARA O EXAME

- Não coma ou beba nada 8 horas antes do exame.

OBSERVAÇÕES

- Tomar medicações de uso diário normalmente.
- Paciente com hipertensão arterial em tratamento, deve-se tomar a medicação às 5 horas da manhã com meio copo de água.
- Se fizer uso de hipoglicemiante (remédio para diabetes), não deverá tomá-lo no dia do exame.
- Os procedimentos endoscópicos podem ser realizados em pacientes em uso de Anticoagulantes e AINES na ausência de outras condições hemorrágicas pré existentes, para tanto, deve-se procurar o seu médico assistente para verificar a possibilidade de suspendê-los de acordo com as orientações descritas abaixo:

| DROGA: | SUSPENDER: |
|--|----------------------------|
| Ácido acetilsalicílico (AAS, Aspirina, Aspirina Prevent, Somalgin, Ecasil) | Não precisa suspender |
| Dipiridamol (Persantin) | 2-3 dias antes do exame |
| Clopidogrel (Plavix) | 5-7 dias antes do exame |
| Ticagrelor (Brilinta) | 3-5 dias antes do exame |
| Prasugrel (Effient) | 5-7 dias antes do exame |
| Ticlopidina (Ticlid) | 10-24 dias antes do exame |
| Abciximab (ReoPro) | 24 horas antes do exame |
| Eptifibatide (Integrilin) | 4 horas antes do exame |
| Warfarin (Marevan, Coumadin) | 5 dias antes do exame |
| Heparina: EV - Endovenosa | 2-6 horas antes do exame |
| Heparina: SC - Subcutânea | 12-24 horas antes do exame |
| Enoxaparina | 24 horas antes do exame |
| Dalteparina (Fragmin) | 24 horas antes do exame |
| Fondaparinux (Arixta) | 36-48 horas antes do exame |
| Rivaroxaban (Xarelto) | 3-4 dias antes do exame |
| Apixaban (Eliquis) | 3-4 dias antes do exame |

- Trazer os exames realizados anteriormente.

ORIENTAÇÕES APÓS O EXAME

- Não deverá dirigir após o exame ou realizar tarefas que necessitem de atenção, pois seus reflexos estarão diminuídos.
- Não ingerir bebidas alcoólicas por 24 horas.
- Vir acompanhado por um adulto (OBRIGATÓRIO).