GASTROVITA LTDA – ME CNPJ: 16.586.685/0001-30 Rua São Pedro, 1970 – Centro **Teresina – Piauí** CEP: 64.001-260	ORIENTAÇÕES AO PACIENTE PARA O **EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA** **EXAME PELAMANHÃ**

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

É um exame que permite estudar o esôfago, estômago e duodeno por meio de um tubo flexível que contém uma lente, luzes e um canal onde o médico poderá trabalhar para coletar material ou realizar algum tratamento.

COMO É REALIZADO

Você deitará sob o lado esquerdo. Um protetor plástico será colocado entre seus dentes para manter sua boca aberta durante o exame. Um tubo flexível, fino e pequeno, será passado através de sua boca e por meio dele, o médico conseguirá enxergar anormalidades que possam estar presentes. Se necessário, pequenas amostras de tecido (biópsia) podem ser coletadas para análise de laboratório. Não causa dor. Alguns tratamentos como ligadura de varizes esofágicas, estancamento de sangramento, remoção de objetos engolidos, retirada de pólipos ou dilatação de esôfago também podem ser realizados por endoscopia.

Será aplicado um anestésico local no fundo da garganta, em spray, que permitirá a passagem do aparelho sem provocar dor ou náuseas. Antes do exame, será aplicada medicação na veia, que provocará sonolência e relaxamento. Esta medicação pode continuar a provocar sono e esquecimento algumas horas após o exame.

PREPARO PARA O EXAME

- Não coma ou beba nada 8 horas antes do exame.
- Comparecer ao Hospital às____:____

QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO EXAME

- É um exame rápido, dura em média 15 minutos.

OBSERVAÇÕES

- Tomar medicações de uso diário normalmente.
- Paciente com hipertensão arterial em tratamento, deve-se tomar a medicação às 5 horas da manhã com meio copo de água.
- Se fizer uso de hipoglicemiante (remédio para diabetes), não deverá tomá-lo no dia do exame.
- Os procedimentos endoscópicos podem ser realizados em pacientes em uso de Anticoagulantes e AINES na ausência de outras condições hemorrágicas pré existentes, para tanto, deve-se procurar o seu médico assistente para verificar a possibilidade de suspendê-los de acordo com as orientações descritas abaixo:

DROGA:	SUSPENDER:
Ácido acetilsalicílico (AAS, Aspirina, Aspirina Prevent, Somalgin, Ecasil)	Não precisa suspender
Dipiridamol (Persantin)	2-3 dias antes do exame
Clopidogrel (Plavix)	5-7 dias antes do exame
Ticagrelor (Brilinta)	3-5 dias antes do exame
Prasurgel (Effient)	5-7 dias antes do exame
Ticlopidina (Ticlid)	10-24 dias antes do exame
Abciximab (ReoPro)	24 horas antes do exame

Eptifibatide (Integrilin)	4 horas antes do exame
Warfarin (Marevan, Coumadin)	5 dias antes do exame
Heparina: EV - Endovenosa	2-6 horas antes do exame
Heparina: SC - Subcutânea	12-24 horas antes do exame
Enoxaparina	24 horas antes do exame
Dalteparina (Fragmin)	24 horas antes do exame
Fondaparinux (Arixta)	36-48 horas antes do exame
Rivaroxaban (Xarelto)	3-4 dias antes do exame
Apixaban (Eliquis)	3-4 dias antes do exame

ORIENTAÇÕES APÓS O EXAME

- Não deverá dirigir após o exame ou realizar tarefas que necessitem de atenção, pois seus reflexos estarão diminuídos.
- Não ingerir bebidas alcoólicas por 24 horas.

- Vir acompanhado por um adulto (OBRIGATÓRIO).